

## انديکاسيون های نمونه گيري از نظر التور (تهيه نمونه سوآپ رکتال) در نظام مراقبت کشوري

بالا بردن ميزان حساسيت نظام مراقبت بيماری وبا در کشور در قالب اجرای نظام مراقبت سندرميک ، همچنين ارتقاء شاخص نمونه گيري از موارد مشکوک به وبا از جمله مهم ترين اقدامات در برنامه مراقبت وبا محسوب ميگردند. در نظام کشوري مراقبت وبا ، در موارد زير بايد نمونه گيري از نظر التور انجام شود:

- ۱- هر فرد ۲ سال و بالاتر مبتلا به اسهال حاد آبکی با کم آبی شديد يا متوسط در تمام فصول سال
- ۲- مرگ از اسهال با هر سنی (تهيه نمونه سوآپ رکتال از فرد فوت شده و همچنين از موارد تماس های نزديک فرد متوفی )
- ۳- وقوع هر مورد طغيان بيماری اسهال حاد آبکی در منطقه صرف نظر از سن و يا شدت بيماری (تهيه ۲-۳ سوآپ رکتال). در مواقع مواجهه با طغيان عموماً توصیه می شود از ۵ درصد موارد علامت دار نمونه تهيه شود.
- ۴- مشکوک شدن به بيماری وبا توسط پزشک معالج

با توجه به اينکه همه گيري COVID-19 هنوز خاتمه نيافته است ، تاکيد می گردد که در مواجهه با بيمارانی که طبق تعاريف فوق انديکاسيون نمونه گيري از نظر التور دارند ، تهيه نمونه رکتال سوآپ و همچنين انتقال نمونه های اخذ شده با رعايت احتياطات های توصیه شده برای پيشگيري و کنترل عفونت در وبا و COVID-19 انجام شود.