

معیارهای انجام آزمایش HIV

- ✓ بیماران با سابقه بیماریهای آمیزشی اثبات شده
- ✓ گروه های پر خطر مانند معتادان تزریقی ، مردان هم جنس باز و افراد با رفتارهای پر خطر جنسی
- ✓ مبتلایان به هموفیلی، دریافت کنندگان مکررخون یا فراورده های خونی
- ✓ زنان در سنین باروری، زنان باردار با رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد تزریقی و بی بندوباری جنسی، همسر معتاد تزریقی، همسر مردی که رفتار پرخطر جنسی دارد، همسر فرد آلوده به HIV و تولد یا زندگی در مناطق با شیوع بالای HIV
- ✓ شک به علائم بالینی و نتایج آزمایشگاهی مطابق با عفونت HIV و بیماریهای نشانگر ایدز، مانند لنفودنوپاتی منتشر پایدار، تب و یا اسهال مزمن با علت ناشناخته، کاهش وزن بدون علت ویا عوارض ناشی از عفونت ایدز مانند کاندیدیاز دهانی، لکو پلاکی پرزی دهانی پنومنی ناشی از پنوموسیستیس کارینی، سائیتوپنی بی علت و اختلال های نورولوژیک مانند مننژیت آسپتیک بی علت و سل فعال یا سل شدید منتشر
- ✓ افراد در تماس با خون یا مایعات آلوده ی بدن بیماران مانند پزشکان و پرستاران در صورت تماس با مورد مشکوک
- ✓ افرادی که از نظر شغلی در معرض خطر هستند مانند رانندگان کامیون ترانزیت، ملوانان، زندانیان و زندانبانان (به صورت دیده وری یا داوطلبانه)
- ✓ اهدا کنندگان خون و عضو و
- ✓ افراد با سابقه رفتار پرخطر و داوطلب انجام آزمایش