

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ





آموزش سلامت  
مرکز بهداشت استان اصفهان



معاونت بهداشتی  
مرکز بهداشت استان اصفهان

# قلیان: بالای قدیم و جدید

برنامه بسیج اطلاع رسانی علیه قلیان  
در شهر اصفهان




آموزش سلامت  
مرکز بهداشت استان اصفهان





# تاریخچه

- ❖ زمان شیوع آن به سلسه صفویه باز می گردد.
- ❖ از ایران به هندوستان، مصر ، لبنان، سوریه ، فلسطین و اردن رفت.
- ❖ در سال های اخیر در آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی ، اروپا ، استرالیا ، جنوب شرقی آسیا و آفریقای مرکزی نیز شایع شده است.
- ❖ اسامی: نارجیله(نارگیل)، شیشه، کریم خان(قرن 18 در مصر) ، حوكا و حقه



❖ بهادر شاه دوم در حال جلوس بر تخت سلطنتی هندوستان، در حال کشیدن قلیان



# تاریخچه

- ❖ اختراع بوسیله طبیب دربار اکبر شاه مغول(1540-1605 میلادی). عرفان شیخ یا حکیم ابوالفتح گیلانی در ربع اهلی شیرازی به استعمال قلیان اشاره شده است
- ❖ در زمان شاه طهماسب صفویه استفاده می شده





## تاریخچه

❖ قدیم‌ترین ذکری که از قلیان در ادبیات فارسی شده، این رباعی‌ها از اهلی شیرازی از معاصران شاه اسماعیل صفوی است که در سال 942 (اوایل شاه طهماسب صفوی) هجری قمری در گذشته است.

نی در دهن تو نیشکر می‌گردد  
ابریست که برگرد قمر می‌گردد"

"قلیان ز لب تو بهره ور می‌گردد  
بر گرد رخ تو دود تنباقو نیست

❖ بنابراین می‌توان گفت که در سال 942، یعنی 29 سال پس از ورود پرتقالی‌ها به خلیج فارس، قلیان کشیدن در ایران رواج یافته است. در واقع می‌توان پیشینه استفاده از قلیان را حداقل به دوران شاه طهماسب یکم صفوی بازگرداند و روایت ابوالفتح گیلانی را شاهدی بر معرفی قلیان، که در ایران مورد استفاده بوده است، در شبه قاره هند دانست.






# تاریخچه

- ❖ شاه عباس قویا آن را نهی می کرد.
- ❖ شاه صفی آن را ممنوع کرد ولی به دلیل در آمدی که برای او داشت این ممنوعیت لغو شد.
- ❖ زمان شاه عباس دوم به یک اعتیاد عمومی در جامعه تبدیل شد و از این زمان شغل **قلیان دار** درست شد.
- ❖ تصاویری از کریم خان زند و فتحعلی شاه قاجار در حال استعمال قلیان وجود دارد
- ❖ در ایران تنباکو مخصوصی وجود داشته به نام **تنباکوی خوانساری** که دود آن کمتر از تنباکوی معمولی است.



# وضعیت قلیان در شهر اصفهان

- ❖ بیش از 500 مرکز فعال ارائه قلیان
- ❖ به عنوان بخشی از تفریح و پیک نیک
- ❖ استفاده در منزل
- ❖ استفاده در محل کار





# قیمت

❖ قلایان آماده:


معمولی: 2000 تومان تا 5000 تومان

میوه ای: 2500 تومان تا 25000 تومان

❖ تنباکوی بسته ای (حدود 100 گرم):

معمولی (حکوم): 1100 تا 1200 تومان

میوه ای: از 2500 تا 3200 تومان





# مواجهه با دود قلیان

- ❖ هر وعده قلیان 30-60 دقیقه
- ❖ متوسط هر وعده 50 پک
- ❖ حجم هر پک حدود 500 میلی لیتر
- ❖ حجم کل 25000 میلی لیتر



# مواجهه با سیگار

❖ وزن یک سیگار معمولی با طول 100 میلی متر (بدون احتساب فیلتر) حدود 1/2 گرم و وزن توتون آن 0/9 گرم است

❖ وزن توتون 20 سیگار معمولی 18 گرم است



# مواجهه با دود قلیان

آموزش سلامت  
مرکز بهداشت استان اصفهان

پک ساعت قلیان کشیدن:

- ❖ 119 لیتر دود حاوی 150 میلی گرم گاز CO و 4 میلی گرم نکوتین و 602 میلی گرم فطران
- ❖ متوسط زمان هر پک 3 ثانیه
- ❖ حجم هر پک 626 میلی لیتر
- ❖ متوسط زمان بین دو پک 17-22 ثانیه



# قليان USB



کاملاً بی خطر  
بی نیاز به ذغال  
ارسال فوری  
قیمت مناسب  
خرید پستی  
مخصوص گسانی که آسان قلیان کشیدن را  
ترجیح می دهد.





# مواجهه با دود قلیان

- ❖ نیکوئین، مواد سرطان زا و سایر سموم مانند منواکسیدکربن و فطران در دود قلیان باقی می‌مانند
- ❖ میزان آرسنیک، کرومیوم (رنگ مصنوعی) و سرب موجود در قلیان بیش از سیگار است.



# مواجهه با دود قلیان

❖ کسانی که قلیان می کشند برای احساس بهتر پک های عمیق تری و بیشتری می زنند.

❖ کسانی که قلیان می کشند در مقایسه با کشیدن یک سیگار 200 برابر بیشتر حجم دود استنشاق می کنند و مواجهه آن ها با نکوتین 3 برابر بیشتر است



# مواجهه با دود قلیان

❖ حتی قلیان کشیدن هر از چند گاهی باعث افزایش فشار خون و افزایش ضربان قلب می شود.

❖ زغال مورد استفاده در قلیان باعث ایجاد مقداری زیادی منوکسید کربن، فلزات سنگین و مواد سرطان زا می شود.



# مواجهه با دود قلیان

درجه حرارت از داغ ترین نقطه حرارت **450** درجه سانتی گراد تا کم ترین حرارت **50** درجه سانتی گراد می باشد. مواد خشک غیر از نکوتین بیشتر حاصل تثبیت مواد هستند تا حاصل ترکیب شیمیایی که از این جهت با سیگار متفاوت است.


# الفاخر AL FAKHER

النكهة الممتازة - الرائحة الزكية - طعم اليوم

المكونات : تبغ . عسل . جليسرين . نكهات طبيعية

COMPONENTS : Tobacco - Molasses - Preservatives - Natural Flavour

ALFAKHER  
APPLE 250 Gr



6 291100 730056

نيكوتين : ٠٠٥٪، قطران : ٪

Nicotine : 0,05%, Tar : ٪

250 Grams ٢٥٠ غرام

تحذير صحي : التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين

**Health Warning :** Smoking is a main cause of Lung cancer,  
Lung diseases and of Heart and arteries diseases

صالحة لمدة  
عامين من تاريخه

JUN 2006

تاريخ الانتاج :



## Waterpipe<sup>1</sup>

## Cigarette<sup>2</sup>

Tar (mg)

802

22

Nicotine (mg)

3.0

1.7

CO (mg)

145

17

<sup>1</sup>Shihadeh, 2005; <sup>2</sup>Djordjevic, 2000

In 100 puffs



## Toxin (ng)

## Waterpipe<sup>1</sup>

## Cigarette<sup>2</sup>

Arsenic

165

80

Beryllium

65

300

Chromium

1340

37

Cobalt

70

0.17

Lead

6870

60

Nickel

990

17

<sup>1</sup>Shihadeh, 2003; <sup>2</sup>Hoffman, 2000



# زیان های شناخته شده قلیان

آموزش سلامت  
مرکز بهداشت استان اصفهان

الف - دود قلیان حاوی :

✓ مواد سرطان زا ، قطران ، منوکسید کربن ،  
فلزات سنگین ، نیکوتین

ب - کشیدن قلیان با این ها همبستگی دارد:

✓ سرطان ، بیماری های قلبی عروقی ،  
کاهش فعالیت ریه ، وابستگی به نکوتین



## زیان های شناخته شده قلیان

- ❖ مصرف طولانی مدت دخانیات به طور متوسط 10-15 سال از عمر انسان کم می کند.
- ❖ از بین 7000 ماده شیمیایی تنباکو 70 تا از آنها سرطان زا هستند.
- ❖ دود ثانویه دخانیات خطرناک تراز دود مستقیم آن است و حاوی 4000 نوع ماده سمی می باشد.



# عوارض دخانیات

- ❖ عفونت گوش، نفس تنگی، ایجاد حساسیت، سرطان، بوی لباس و فرمزی چشمها
- ❖ همچنین در طولانی مدت باعث کاتاراکت (آب مروارید) (بوی بد دهان، بیماری لثه، خرابی و تغییر رنگ دندانها سرطان زبان و دهان، افزایش خطر سکته، خشکی و چروک پوست، زردی ناخن‌ها، آسم، نفس تنگی، سرطان ریه، افزایش فشار خون، تنگ شدن سرخرگ‌ها، سرطان پانکراس، سرطان مثانه، سرطان حنجره و زخم معده می‌شود.
- ❖ در خانمهای باردار باعث خطرات جدی برای جنین می‌شود.
- ❖ نیکوتین در مغز باعث اعتیاد شدید و کم شدن سوخت و ساز آن می‌شود چون مواد غذایی به آن کمتر می‌رسد.



## زیان های شناخته شده قلیان

❖ همچنین در طولانی مدت باعث کاتاراکت (آب مروارید) (بوی بد دهان، بیماری لثه، خرابی و تغییر رنگ دندانها سرطان زبان و دهان، افزایش خطر سکته، خشکی و چروک پوست، زردی ناخن ها، آسم، نفس تنگی، سرطان ریه، افزایش فشار خون، تنگ شدن سرخرگ ها، سرطان پانکراس، سرطان مثانه، سرطان حنجره و زخم معده می شود. در خانمهای باردار باعث خطرات جدی برای جنین می شود. نیکوتین در مغز باعث اعتیاد شدید و کم شدن سوخت و ساز آن می شود چون مواد غذایی به آن کمتر می رسد.




# گزارش اولیه بررسی وضعیت مصرف قلیان در شهر اصفهان

► در سطح شهر اصفهان جمua 1126 نفر) 553 نفر زن و 573 نفر مرد ) پرسشنامه مربوط به بررسی وضعیت را تکمیل نمودند.




# نمودار الگوی مصرف قلیان در مردان در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲

- هر روز تا هفته‌ای حداقل یک بار
- حداقل یک بار در ماه و کمتر از یک بار در هفته
- قبل مصرف داشته و اکنون نمی‌کشد
- هرگز قلیان نکشیده





# نمودار الگوی مصرف قلیان در زنان در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲



هرگز قلیان نکشیده      قبل مصرف داشته و اکنون هر روز تا هفته ای حداقل حداقل یک بار در ماه و  
کمتر از یک بار در هفته  
نمی کشد



# قديم و جديد





آموزش سلامت  
مرکز بهداشت استان اصفهان

# جوان و قلیان





آموزش سلامت  
مرکز بهداشت استان اصفهان

# سالمند و قلیان





# گزارش الگوی مصرف قلیان

نتایج نشان دادند که:


1. در تمام اشکال الگوی مصرف، مردان در مقایسه با زنان بیشتر قلیان می کشند.
2. مجردها بیش از متاهلین تجربه مصرف قلیان را گزارش کرده اند.
3. افرادی که در گروه های سنی پایین تر قرار دارند بیش از گروه های سنی بالا بر این باور هستند که والدین از مصرف قلیان توسط فرزندان زیاد ناراحت نمی شوند.



# نمودار مقایسه الگوی مصرف در مجردین و متاهلین


## الگوی مصرف قلیان در مجردها

- هر روز تا حداقل هفته ای یک بار
- حداقل یک بار در ماه و کمتر از یک بار در هفتة
- قبل قلیان می کشیدم ولی در حال حاضر نمی کشم
- هرگز قلیان نکشیده ام



## الگوی مصرف قلیان در متاهلین

- هر روز تا حداقل هفته ای یک بار
- حداقل یک بار در ماه و کمتر از یک بار در هفتة
- قبل قلیان می کشیدم ولی در حال حاضر نمی کشم
- هرگز قلیان نکشیده ام





## نتایج بدست آمده از تحلیل نگرش افراد در خصوص مصرف قلیان:

1. مردان بیش از زنان این نگرش را دارند که مصرف قلیان در جمیع های دوستانه، باعث گرم تر و صمیمانه تر شدن جمع آنها می شود.
2. افرادی که دارای تحصیلات بالاتر هستند با این نگرش که سوم موجود در تنباکو از راه آب موجود در قلیان تصفیه می شود، و خطر قلیان از سیگار کمتر است مخالف هستند.
3. افراد با تحصیلات بالاتر بیش از افرادی که تحصیلات پایین تری دارند دود ناشی از قلیان را برای کسانی که در کنار افراد مصرف کننده قرار دارند ، مضر می دانند.
4. متاهلین بیش از مجردین بر این باور هستند که دود ناشی از قلیان برای کسانی که در کنار افراد مصرف کننده قرار دارند نیز مضر است





# با تشکر از توجهتان

